

**LISTE DES VÉRIFICATIONS AVANT D'ENTRER DANS LA CHAMBRE  
D'UN USAGER SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ COVID-19 :  
PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES/CONTACT + PROTECTION OCULAIRE**

2020-10-19\_Équipe PCI

	<b>DANS LE CORRIDOR :</b>
<input type="checkbox"/>	Déterminer le ou les professionnels qui doivent absolument être dans la chambre
<input type="checkbox"/>	S'assurer de la présence dans la chambre : <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'une poubelle pour les EPI souillés</li> <li>• d'un stéthoscope</li> <li>• d'un thermomètre jetable</li> <li>• d'un distributeur de SHA (solution hydro-alcoolique) près de la porte</li> </ul> S'assurer de la présence dans l'antichambre (ou au corridor à la sortie de la chambre si pas d'antichambre): <ul style="list-style-type: none"> <li>• des EPI (masques de procédure, lunettes de protection ou visière, gants, blouses régulières et imperméables, papier essuie-mains en quantité suffisante et lingettes désinfectantes)</li> <li>• d'une poubelle pour les EPI souillés</li> <li>• d'un distributeur de SHA</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Retirer bijoux, montre, téléavertisseur et téléphone
<input type="checkbox"/>	S'attacher les cheveux pour avoir le visage dégagé
<input type="checkbox"/>	Regrouper le matériel requis pour les soins dans la chambre
	<b>DANS L'ANTICHAMBRE (AU CORRIDOR SI PAS D'ANTICHAMBRE OU DANS L'AIRE D'HABILLAGE SI COHORTE) :</b>
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Choisir la blouse à revêtir en attachant tous les cordons (s'assurer qu'elle recouvre bien le dos) : La blouse imperméable doit être utilisée lors de vomissements, de diarrhées, d'un risque de contact avec de grandes quantités de liquides biologiques (voir la fiche technique pour plus de détails). <b>Sinon, choisir blouse régulière.</b>
<input type="checkbox"/>	Mettre le masque de procédure Si vous portez déjà un masque de procédure, s'assurer qu'il soit bien ajusté au niveau du nez et qu'il couvre bien votre menton. Au besoin, changer le masque de procédure s'il est visiblement souillé ou humide. Ne pas porter un couvre-visage maison.
<input type="checkbox"/>	Mettre les lunettes de protection (1 <sup>er</sup> choix) ou la visière en zone froide (2 <sup>e</sup> choix). Si disponibles à l'unité, utiliser les lunettes fournies qui seront envoyées à l'URDM par la suite. Sinon, utiliser les lunettes personnelles de protection qui vous ont déjà été fournies.
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Enfiler les gants réguliers ou de nitrile en s'assurant de bien recouvrir l'extrémité de la manche. Au besoin, percer la manche de la blouse avec le pouce avant de mettre les gants.
<input type="checkbox"/>	Faire des mouvements pour valider le confort de l'équipement
<input type="checkbox"/>	L'intervenant ne doit pas toucher son visage, son masque ou toute autre zone non couverte
<input type="checkbox"/>	<b>Attendre le OK de l'observateur avant d'entrer dans la chambre</b>

SHA : solution hydro-alcoolique EPI : équipement de protection individuelle

**LISTE DES VÉRIFICATIONS À LA SORTIE DE LA CHAMBRE D'UN USAGER SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ COVID-19:  
PRÉCAUTIONS GOUTTELETTES/CONTACT + PROTECTION OCULAIRE**

2020-10-19\_Équipe PCI

<b>DANS LA CHAMBRE (OU DANS L'AIRE DE DÉSHABILLAGE SI COHORTE) :</b>	
<input type="checkbox"/>	Chaque intervenant procède, à tour de rôle, au retrait de l'EPI
<input type="checkbox"/>	L'intervenant doit s'assurer d'avoir la distance d'un mètre de dégagé autour de lui et d'être à <u>2 mètres des voies respiratoires de l'usager</u> . Si ce n'est pas possible toutes les étapes doivent être réalisées dans l'antichambre (ou au corridor si pas d'antichambre).
<input type="checkbox"/>	L'intervenant doit avoir à portée de main la poubelle et le distributeur de SHA
<input type="checkbox"/>	Dire à l'intervenant qu'il est important de ne pas se toucher le visage avec les mains
<input type="checkbox"/>	Retirer lentement la paire de gants : on doit pincer le 1 <sup>er</sup> gant au poignet, le rouler à l'intérieur de la main gantée souillée et retirer le 2 <sup>e</sup> gant en entrant l'index à l'intérieur du gant contaminé restant
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Retirer lentement la blouse. L'éloigner du corps en la roulant délicatement
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Retirer la protection oculaire (lunettes ou visière) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si lunettes de protection fournies par l'unité qui seront envoyées à la stérilisation par la suite : les retirer en les prenant par les branches le plus loin possible des yeux et les déposer dans un sac brun à l'extérieur de la chambre.</li> <li>• Si lunettes personnelles de protection : les conserver en place (elles seront retirées et nettoyées à l'extérieur de la chambre)</li> <li>• Si visière : retirer la visière en tenant l'élastique derrière la tête le plus loin possible du visage et la mettre dans le bac de récupération prévu à cet effet à l'intérieur de la chambre</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Retirer le masque de procédure sans toucher le devant du masque
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Sortir de la chambre
<input type="checkbox"/>	<b>Garder la porte fermée dans la mesure du possible</b>
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains.
<input type="checkbox"/>	Mettre le sac brun contenant les lunettes dans le bac prévu à cet effet au corridor *** Ne pas envoyer vos lunettes personnelles de protection à la stérilisation (procéder au retrait et au nettoyage selon la vidéo <<Port des lunettes de sécurité>>
<input type="checkbox"/>	Étapes pour sortir de la chambre si équipement (ex. : glucomètre) ou prélèvement à sortir : <ul style="list-style-type: none"> <li>- mettre un gant de procédure</li> <li>- prendre l'équipement ou le sac contenant le prélèvement avec la main gantée</li> <li>- si équipement : le déposer sur une table propre à la sortie de la chambre ou le remettre à une personne qui porte des gants propres à la sortie de la chambre pour le désinfecter (ne pas mettre dans un sac).</li> <li>- si prélèvement : déposer le sac dans un autre sac propre (une autre personne en externe tient le sac propre)</li> </ul>

SHA : solution hydro-alcoolique EPI : équipement de protection individuelle