

Les soins et les procédures dans la cohorte doivent être effectués uniquement par du personnel formé et qualifié.

	Avant d'entrer	Dans la cohorte	À la sortie
Aucune entrée requise dans la chambre	1- HDM* 2- Masque de procédure 3- Gants et blouse si risque de contact avec du matériel dans la cohorte ✓ Pour une surveillance d'un usager : HDM, masque de procédure, gants, blouse, protection oculaire	Demeurer à 2 mètres des autres intervenants qui circulent dans la cohorte, si possible. Sinon, respecter minimalement un mètre de distance. Pour changer les gants : les retirer, procéder à l'HDM et remettre des gants propres. Un intervenant peut prendre des notes sur ses documents/tablette personnels si ces derniers n'entrent pas en contact avec l'environnement de la cohorte. Pour donner du matériel à l'intervenant dans la chambre : 1- Déposer le matériel sur une table propre devant la porte de la chambre. Sinon, mettre le matériel dans un sac propre et le fixer au cadre de porte. 2- L'intervenant dans la chambre attend qu'il n'y ait personne à moins de 2 mètres de la porte. 3- L'intervenant dans la chambre ouvre la porte et récupère le matériel.	Retrait de l'EPI*** : HDM entre chaque étape
Entrée dans la chambre	1- HDM 2- EPI*** selon précautions additionnelles en place : Gouttelettes/contact + protection oculaire OU Aériennes/contact renforcées. ✓ Mettre blouse imperméable si vomissements/diarrhées, si risque d'éclaboussures importantes ou si une IMGA doit être réalisée dans la chambre	Entre chaque usager, à l'extérieur de la chambre : changer seulement les gants, HDM avant de mettre les gants propres. Retirer l'EPI uniquement à la sortie de la cohorte. Changement de l'équipement : Changer l'équipement au complet (à la sortie de la cohorte), si : - Visiblement souillé - Contact avec des éclaboussures ou possibilité d'avoir reçu des éclaboussures de liquide biologique - Usager en précautions additionnelles autres que COVID-19 (ex : gastro, C. diff., SARM). Terminer la tournée par cet usager - Masque de procédure/chirurgical humide ou si doute de l'étanchéité du masque N-95 Pour changer la blouse seulement : 1- Se rendre à la sortie de la cohorte 2- Changer les gants et la blouse, ne pas oublier l'HDM 3- Conserver la visière et le masque Pour changer le masque seulement (procédure/chirurgical ou N-95) : 1- Se rendre à la sortie de la cohorte 2- Retirer TOUT L'EPI selon les étapes 3- Enfiler un nouvel EPI à l'entrée de la cohorte Communication Utilisation du téléphone : en mains libres seulement . Si indisponible, utiliser l'intercom Infirmière de la dyade à l'extérieur de la cohorte reste en communication avec l'infirmière dans la chambre pour répondre à ses besoins Gestion des excréta - Les usagers confirmés peuvent utiliser la même toilette - Lors de vomissements, utiliser les sacs de type « VomiBag » Administration des médicaments Pas de double vérification indépendante (DVI) requise dans la chambre pour : 1- Vérification de la programmation de la pompe 2- Stylos d'insuline La DVI reste obligatoire pour toute activité exercée à l'extérieur de la chambre. Idéalement, l'infirmière qui a administré le médicament l'inscrit à la FADM. Toutefois, il est autorisé qu'une autre infirmière l'inscrive pour elle à la FADM.	Retrait de l'EPI : HDM entre chaque étape Retrait de l'EPI : HDM entre chaque étape
Désinfection du matériel de soins	1- HDM 2- Gants ✓ Si risque de contact avec du matériel dans la cohorte, porter la blouse	- Utiliser les produits de désinfection réguliers présents à l'intérieur de la cohorte (Lingettes Oxivir Tb ou chlore) selon la procédure PR-DSI-000-31. Si un autre type de précautions additionnelles (ex. : gastro, C. diff.) est présent, choisir le bon désinfectant en respectant la procédure PR-DSI-000-31. - Pour la buanderie et la lingerie : appliquer les procédures régulières. Départ de l'usager en précautions aériennes/contact renforcées : 1- Indiquer sur la porte de la chambre l'heure du départ de l'usager 2- Attendre le temps de retombée requis (1h30 pour chambre à pression négative au C6) 3- Lorsque le temps de retombée est terminé, entrer dans la chambre avec la blouse et les gants seulement pour récupérer le matériel à désinfecter 4- Désinfecter le matériel à l'endroit prévu selon la procédure PR-DSI-000-31 5- Demander la désinfection de la chambre selon l'affichette de précautions additionnelles.	Retrait d'EPI HDM entre chaque étape
Transport d'un usager vers un examen ou vers une autre unité de soins	1-Déterminer tout le personnel/matériel nécessaire pour accompagner l'usager hors de l'unité 2-Si précautions additionnelles toujours en place : ✓ Aviser le service receveur des précautions additionnelles en place ✓ Signaler un coach PCI et un agent de sécurité (pour libérer l'ascenseur) ✓ Libérer les corridors utilisés.	L'usager toujours sous précautions additionnelles : 1- L'usager doit procéder à l'HDM, mettre jaquette et culotte d'incontinence propres 2- Mettre l'EPI à l'usager : o un masque de procédure o une blouse et des gants 3- Mettre un drap sur le fauteuil roulant ou la civière 4- Attendre que l'ascenseur dédié soit arrivé pour quitter L'usager considéré guéri (rétabli) par l'équipe de PCI et qui transfert en zone froide sans précautions additionnelles : 1- L'usager doit procéder à l'HDM, mettre jaquette et culotte d'incontinence propres 2-Désinfecter le matériel de soins qui suit l'usager (selon la procédure PR-DSI-000-31) ou le jeter si non désinfectable. 3-Désinfecter les effets personnels de l'usager (selon la procédure PR-DSI-000-31). Placer les effets non désinfectables dans un sac au garde-robe pour être récupérés par la famille une fois en zone froide.	Ne pas sortir de la cohorte avec l'EPI utilisé auprès de l'usager Un autre intervenant en externe qui porte un EPI propre assure le transport de l'usager

*HDM : Hygiène des mains

**SHA : Solution hydro-alcoolisée

***EPI : Équipement de protection individuelle