



INFO-MÉDICAMENT

**Document préparé par les départements de pharmacie
et d'inhalothérapie à l'intention des usagers**

QUINSAIR^{md} (lévofloxacine) en nébulisation avec dispositif Zirela^{md}

POSOLOGIE : 240 mg en nébulisation 2 fois par jour aux 12 heures (matin et soir)

- 1 mois sur 2 (congé durant 28 jours et reprendre pour 28 jours)
- en continu (tous les mois)
- en alternance avec _____

1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est un antibiotique qui a pour but d'éradiquer la bactérie *Pseudomonas aeruginosa* au niveau des poumons.
- Il est utilisé en association avec d'autres traitements dans le but de diminuer la fréquence des infections respiratoires et d'améliorer la fonction pulmonaire.

2. CONSEILS :

- L'administration de ce médicament peut être **précédée** d'une dose de bronchodilatateur en aérosol-doseur ou en nébulisation.
- Si vous prenez plusieurs médicaments en inhalation, il est recommandé de les prendre dans l'ordre suivant :
 - Bronchodilatateurs
 - Mucolytiques (salin hypertonique, Pulmozyme^{md})
 - Techniques de dégagement des voies aériennes (physiothérapie)
 - **Quinsair^{md}**
 - Corticostéroïdes en inhalation (ex : Pulmicort^{md}, Flovent^{md}, Symbicort^{md}, Advair^{md}, Alvesco^{md}).

3. PRÉPARATION ET ADMINISTRATION :

- Vérifiez la date d'expiration.
- Presser l'ampoule et vider son contenu dans le compartiment prévu à cet effet du dispositif Zirela^{md}.
- La solution devrait être claire et jaune. Ne pas utiliser si la solution est trouble ou s'il y a apparition de particules dans la solution.
- Utiliser immédiatement le médicament selon la technique d'administration indiquée par votre inhalothérapeute. Il faut environ 5 minutes pour prendre la totalité de la dose via le dispositif Zirela^{md}.
- Un document explicatif est disponible concernant l'administration ainsi que le nettoyage du dispositif sur le site : www.pari.com/zirela
- Si vous oubliez une dose de médicament, vous pouvez la prendre un peu plus tard, mais il est important de toujours respecter un intervalle d'au moins 8 heures entre les doses.

4. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Les ampoules de médicament doivent être conservées à la température de la pièce (15-30°C).
- Les ampoules doivent être conservées dans leur emballage initial (sachet de papier d'aluminium) afin de les protéger de la lumière. Les ampoules devraient être utilisées dans les 4 jours suivant l'ouverture du sachet d'aluminium.
- Toujours prendre le Quinsair^{md} avec le dispositif Zirela^{md}, et utiliser ce dispositif pour ce médicament uniquement.
- Éviter une exposition excessive au soleil, car Quinsair^{md} peut rendre la peau plus sensible au soleil.
- Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à la lévofloxacine ou une autre fluoroquinolone (ciprofloxacine, moxifloxacine, gatifloxacine, norfloxacine ou ofloxacine).
- Ne pas utiliser ce médicament si vous avez une rupture ou inflammation du tendon aiguë.
- Contacter votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous planifiez une grossesse.

5. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :

- Ce médicament est **généralement bien toléré**.
- En cours de traitement, il peut survenir :
 - Altération du goût
 - Toux
 - Augmentation de la production d'expectorations
 - Hémoptysie (sang lors de toux)
 - Palpitations
 - Nausées

6. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Aggravation de votre condition
- Éruption cutanée ou tout symptôme attribuable à une réaction allergique
- Apparition ou persistance d'un effet secondaire incommode
- Inflammation d'un tendon avec douleur, raideur et/ou enflure
- Difficulté à respirer (bronchospasme)
- Diarrhée sévère avec ou sans sang dans les selles et/ou fièvre et/ou douleur abdominale.
- Palpitations accompagnées ou non par une perte de conscience.