

Carte pour Angio-Seal exclusivement

- ▶ Garder avec vous la carte d'information pour 90 jours. Après ce temps, les composantes du système de fermeture se seront dissoutes.

Angio-Seal™
Vascular Closure Device

INSERTED: RIGHT LEFT (check one)
Femoral Artery

Date: _____

Deployment Time: _____

Ambulation Time: _____

Deployed By: _____

Lot Number: _____

Clinical Information Service
Toll Free 1 (888) 864-7444



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

Bon retour à la maison!

Consignes de sécurité lors de l'utilisation d'un système **Angio-Seal**^{md} ou **Perclose**^{md}

Révisé en avril 2015 par :

Isabelle Simard, conseillère-cadre aux soins infirmiers


Geneviève Lemire, conseillère clinique aux soins infirmiers

Consensus d'experts :

Dr Jean Champagne, chef du Service d'électrophysiologie

Dr Josep Rodés-Cabau, chef du Service d'hémodynamie

Adopté par le Comité d'enseignement aux usagers
de l'IUCPQ, mai 2015.



Votre intervention a été effectuée par l'aîne. Pour fermer le vaisseau sanguin par lequel le cathéter a été introduit, le médecin a utilisé un système de fermeture de plaie nommé **Angio-Seal^{md}** ou **Perclose^{md}**. Ce système est invisible, vous ne verrez qu'une petite plaie à l'aîne.

Ce feuillet a été conçu pour vous rappeler les consignes à suivre pour éviter les complications.

Reprise des activités

- ▶ **Pour les 2 premiers jours**, évitez la position assise durant de longues périodes. Pour un long parcours en automobile par exemple, arrêtez aux 2 heures pour marcher quelques minutes.
- ▶ **Pour les 3 premiers jours**, évitez les étirements, les efforts modérés (ex : jardiner, monter et descendre les escaliers) à intenses (ex : tondre la pelouse, course à pied). Évitez de soulever une charge de plus de 10 livres. Reprendre progressivement les activités par la suite.
- ▶ **Pour les 4 premiers jours**, prendre seulement des douches afin de favoriser la guérison de la plaie.

Conduite automobile

- ▶ **Pour reprendre** la conduite automobile, vous devez suivre la prescription médicale.

Soins de la plaie

- 1• Changez votre pansement chaque jour ou s'il est souillé ou mouillé.
- 2• Examinez votre plaie tous les jours afin de vous assurer de sa guérison.
- 3• Nettoyez délicatement votre plaie avec de l'eau et du savon doux, l'assécher délicatement et la couvrir d'un nouveau pansement de type Elastoplast^{md} ou Band-Aid^{md}.
- 4• La plaie guérira dans environ 4 jours.

ATTENTION

Consulter un médecin si présence :

- ▶ de fièvre (38,5°C ou 101,3° F);
- ▶ d'écoulement, sensibilité exagérée, rougeur, sensation de chaleur ou gonflement au site de la plaie;
- ▶ d'engourdissement ou douleur à la jambe durant la marche.

Si vous constatez un saignement au site de la plaie

- 1• Faire une compression avec un linge propre de 15 à 20 minutes jusqu'à l'arrêt du saignement.
Si le saignement est arrêté, présentez-vous à l'hôpital ou au Centre de services de santé le plus près de chez vous par la suite pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications au niveau du vaisseau sanguin.
- 2• **Si le saignement persiste** ou reprend, continuez la compression et présentez-vous **d'urgence** à l'hôpital ou au Centre de services de santé le plus près de chez vous car une intervention médicale pourrait être requise.