



Comment  
capturer  
une  
chauve-souris  
de façon sécuritaire ?

Pour capturer une chauve-souris, il est important de prendre les précautions suivantes :

- toujours porter des gants épais ;
- éviter de toucher la chauve-souris, même avec des gants ;
- si la chauve-souris est **vivante**, attendre qu'elle se pose sur une surface permettant de l'emprisonner à l'aide d'un contenant. Pour éviter qu'elle s'envole, glisser un carton rigide sur l'ouverture du contenant, puis fixer le carton au contenant. Conserver l'animal emprisonné en lieu sûr ;
- si la chauve-souris est **morte**, utiliser une pelle ou un autre objet pour la déposer dans un sac épais doublé d'un deuxième sac. Mettre l'animal enveloppé au congélateur ;
- se laver les mains après avoir enlevé les gants ;
- si ce n'est pas déjà fait, aviser Info-Santé 8-1-1. L'intervenant précisera les mesures à prendre pour que la chauve-souris soit récupérée pour analyse.

Pour toute information médicale sur la rage,  
consultez le service Info-Santé 8-1-1.

[www.msss.gouv.qc.ca](http://www.msss.gouv.qc.ca)



# ATTENTION...

une CHAUVE-SOURIS !  
Et si elle avait la rage...

09-277-01FA © Gouvernement du Québec, 2009






DR BRUCK FENILON, YORK UNIVERSITY



## Qu'est-ce qu'une chauve-souris ?

La chauve-souris est le seul mammifère capable de voler. Elle se trouve sur tout le territoire du Québec, autant à la campagne qu'en ville. Elle est active surtout la nuit et elle se nourrit d'insectes qu'elle capture en plein vol. En raison du nombre considérable d'insectes qu'elle dévore, la chauve-souris joue un rôle important dans l'environnement. Elle peut toutefois être atteinte de la rage.



## Qu'est-ce que le virus de la rage ?

Le virus de la rage cause une maladie du cerveau toujours mortelle pour l'humain. Une faible proportion de chauves-souris sont infectées par ce virus et peuvent le transmettre à l'humain. Heureusement, il existe un vaccin contre la rage, qui, administré après un contact avec un animal infecté, empêche la maladie de se développer.

**ATTENTION !**  
UNE CHAUVÉ-SOURIS  
ATTEINTE DE LA RAGE  
PEUT PARAÎTRE  
TOUT À FAIT NORMALE.

**IL NE FAUT JAMAIS  
TOUCHER UNE  
CHAUVÉ-SOURIS !**

## Comment se transmet le virus de la rage ?

Le virus de la rage est présent dans la salive de la chauve-souris infectée. Il se transmet par :

- une blessure infligée par la chauve-souris (morsure, égratignure) ;
- un contact de la salive de la chauve-souris avec une plaie ou une muqueuse (yeux, nez, bouche).



**TOUTE PERSONNE QUI A TOUCHÉ  
UNE CHAUVÉ-SOURIS OU QUI A ÉTÉ TOUCHÉE  
PAR UNE CHAUVÉ-SOURIS DOIT LAVÉ LA PARTIE  
DU CORPS AFFECTÉE AVEC DE L'EAU ET DU SAVON  
PENDANT 10 À 15 MINUTES, PUIS COMMUNIQUER  
AVEC INFO-SANTÉ 8-1-1.**

## ATTENTION !

Une blessure infligée par une chauve-souris, morsure ou autre, peut passer inaperçue. C'est pourquoi une personne qui a touché une chauve-souris ou qui a été touchée par une chauve-souris et qui ne peut exclure une morsure, une égratignure ou un contact de la salive de l'animal avec une plaie ou une muqueuse doit :

- communiquer avec Info-Santé 8-1-1, car une vaccination contre la rage pourrait être indiquée ;
- **suivre les directives de l'intervenant d'Info-Santé 8-1-1, qui jugera de la pertinence de capturer la chauve-souris pour analyse. L'absence de rage chez l'animal permet d'éviter la vaccination.**