

Inhibiteur direct du facteur Xa

Xarelto^{md}

(Rivaroxaban)



Comprimés 10, 15 et 20 mg

• Dose prescrite: _____ • Début de traitement: _____ • Première prise de sang: _____

1- ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament aide à « éclaircir » votre sang. Il diminue la coagulation et prévient la formation de caillots. On l'utilise chez les patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) OU ayant fait une thrombose veineuse profonde (TVP ou "phlébite") ou une embolie pulmonaire.

2- CONSEILS :

- **Ce médicament doit se prendre deux fois par jour. Il est important de prendre votre médicament régulièrement et de ne pas oublier de dose.** Votre observance au traitement est essentielle. Sinon, vous risquez d'être moins bien protégé contre la formation d'un caillot.
- Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. S'il est presque l'heure de votre dose suivante, laissez tomber la dose oubliée. Ne doublez jamais la dose pour tenter de vous rattraper.

3- PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- **Comprimés de 10 mg** : prendre avec ou sans aliment.
- **Comprimé de 15 ou 20 mg** : **DOIT être pris avec des aliments**, idéalement avec le plus gros repas de la journée pour augmenter son absorption et son efficacité.
- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments ou produits naturels (ex : millepertuis). Vérifiez toujours auprès de votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament en association avec d'autres produits.
- Ce médicament peut augmenter les risques de saignement. Soyez prudent lorsque vous utilisez des instruments coupants ou lorsque vous effectuez des travaux manuels dangereux.
- Toujours aviser les professionnels de la santé (pharmacien, médecin, infirmière ou dentiste) de la prise de ce médicament. **Si vous devez être opéré, vous devez en aviser le médecin qui fera la procédure ou la chirurgie.** Il est alors possible qu'on vous demande d'arrêter le médicament pendant quelques jours. Informez vous ensuite de la façon de le reprendre.
- **Il est important d'aller passer les prises de sang** qui vous auront été prescrites afin de permettre à votre médecin et votre pharmacien de s'assurer que ce traitement est sécuritaire pour vous. **Ces prises de sang doivent se faire au moins une fois par année.** Dans certains cas, votre médecin ou votre pharmacien pourra vous prescrire des prises de sang plus fréquemment.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte (ou souhaitez le devenir) ou si vous allaitez.
- Portez sur vous un bracelet ou ayez dans votre portefeuille une liste à jour de vos médicaments. Informez vos proches que vous êtes anticoagulé et connaissez le nom de votre anticoagulant et son dosage.

4- EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :

- Des **ecchymoses** (bleus) en présence de coups.
- Chez les femmes, des règles un peu plus abondantes qu'habituellement.

5- CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Du sang dans votre urine ou des selles noires ou rouges.
- Des ecchymoses (bleus) exagérés sans raison particulière.
- Des saignements de nez qui ne se résorbent pas spontanément.
- Chez les femmes, des saignements anormalement abondants et prolongés lors des règles.
- Des maux de tête inhabituels, de la faiblesse d'un bras ou d'une jambe, la bouche croche ou de la difficulté à parler.

Révision juin 2017