


Pour les personnes souffrant de polypes nasaux

Les gens ayant un asthme associé à des polypes nasaux sont considérés comme étant intolérants à l'aspirine. Ils peuvent présenter des crises d'asthme graves à la prise d'aspirine (voir liste A) ou de certains médicaments anti-inflammatoires (voir liste B).


Qu'est-ce que les polypes nasaux ?

Les polypes nasaux sont formés de tissus inflammatoires qui bouchent les conduits du nez. La rhinite allergique prédispose à la formation de polypes nasaux mais la cause exacte est encore inconnue. Malgré les traitements, les polypes nasaux réapparaissent souvent. Ils sont difficiles à traiter.




Traitement médical des polypes nasaux

Pour traiter les polypes nasaux, on prescrit généralement un inhalateur nasal. Ces médicaments se nomment : Rhinalar^{MD}, Rhinocort^{MD}, Rivanase^{MD}, Flonase^{MD}, Nasonex^{MD}, Nasocort^{MD}, etc. Ils ont pour effet de réduire ou d'éliminer les polypes nasaux. Dans les cas plus difficiles, de la cortisone en comprimés (Prednisone^{MD}, Deltasone^{MD}) peut être nécessaire. Si cela se produit suivez les recommandations de votre médecin quant à son utilisation.



Traitement chirurgical des polypes nasaux

Dans certains cas, il se peut que le traitement médical soit insuffisant et que l'ablation chirurgicale des polypes soit indiquée. Il est possible cependant que ces derniers réapparaissent à plus ou moins brève échéance.




CENTRE DE PNEUMOLOGIE



Institut universitaire
de cardiologie
et de pneumologie

Intolérance à l'aspirine



Consultation d'asthme
et immuno-allergie
pulmonaire

Centre de pneumologie
et
Département de pharmacie
de l'Hôpital Laval


2725, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy G1V 4G5

CLINIQUES SPÉCIALISÉES
DE PNEUMOLOGIE

Intolérance à l'aspirine

Certaines personnes asthmatiques ne tolèrent pas l'aspirine ou ses dérivés. Chez ces individus, la prise d'aspirine ou de ses dérivés peut provoquer une crise d'asthme sévère. Si vous êtes diagnostiqué intolérant à l'aspirine ou avez des polypes nasaux, il vous faut éviter les médicaments qui contiennent de l'aspirine (voir liste A) ou certains médicaments anti-inflammatoires (voir liste B).

Les médicaments de la liste B ne contiennent pas d'aspirine mais peuvent provoquer des symptômes d'asthme chez certaines personnes asthmatiques.



Liste A*

Médicaments contenant de l'aspirine

222 ^{MD}	Novasen ^{MD}
282 ^{MD}	Obusforme ^{MD}
292 ^{MD}	Oxycodan ^{MD}
692 ^{MD}	PC-AC & C ^{MD}
A.A.S. ^{MD}	Percodan ^{MD}
Alka-Seltzer ^{MD}	PMS-AC & C ^{MD}
Anacin ^{MD}	Rivasa ^{MD}
Asaphen ^{MD}	Robaxial ^{MD}
Asasantine ^{MD}	Spasmhalt-AAS8 ^{MD}
Aspergum ^{MD}	Tecnal ^{MD}
Aspirin ^{MD}	Trianal ^{MD}
Bufferin ^{MD}	Wampole
Coricidin ^{MD}	Wampole AC & C ^{MD}
Endodan ^{MD}	
Entrophen ^{MD}	
Fiorinal ^{MD}	
Instantine ^{MD}	
Methoxisal ^{MD}	
Midol ^{MD}	
Nervine ^{MD}	
Norgesic ^{MD}	

* Liste partielle

Liste B*

Autres médicaments pouvant provoquer de l'asthme chez les personnes intolérantes à l'aspirine

(Ex : médication pour l'arthrite)

Actiprofen ^{MD}	Naproxen
Advil ^{MD}	Novomethacin ^{MD}
Anaprox ^{MD}	Novo-profène ^{MD}
Ansaid ^{MD}	Orudis ^{MD}
Arthrotec ^{MD}	Piroxicam
Célébrex ^{MD}	Relafen ^{MD}
Clinoril ^{MD}	Sulindac
Diclofénac	Surgam ^{MD}
Dolobid ^{MD}	Ténoxicam
Feldene ^{MD}	Toradol ^{MD}
Froben ^{MD}	Ultradol ^{MD}
Ibuprofène	Vioxx ^{MD}
Indocid ^{MD}	Voltaren ^{MD}
Indométhacine	
Mobiflex ^{MD}	
Motrin ^{MD}	
Nalfon ^{MD}	
Naprosyn ^{MD}	

* Liste partielle

Médicaments à prendre pour soulager la douleur ou la fièvre si vous êtes intolérant à l'aspirine

Si vous avez besoin de médicaments contre la douleur ou la fièvre, prendre un analgésique contenant de l'acétaminophène : Atasol^{MD}, Tempra^{MD}, Tylenol^{MD}, Abenol^{MD}, Novo-Gesic^{MD}, etc. Pour plus de renseignements demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

Prise accidentelle d'aspirine et bracelet d'identification

Si vous prenez accidentellement de l'aspirine et que vous avez un ou plusieurs des symptômes suivants : difficulté à respirer, de l'oppression, de l'essoufflement, de la rougeur sur la peau ou une congestion nasale, communiquez immédiatement avec votre médecin ou rendez vous à l'urgence la plus proche. Pour votre protection, il est conseillé de porter un bracelet qui indique que vous êtes intolérant à l'aspirine.