

Signes à surveiller et recommandations :

- La toux peut être plus fréquente pendant quelques jours. Un antitussif pourra être prescrit par le médecin.
- Les signes d'infection à surveiller sont : rougeur, oedème (enflure), écoulement verdâtre. Un antibiotique est donné pour diminuer les risques d'infection du site de la procédure.
- La douleur (inconfort) peut être présente au site d'insertion. Un analgésique (médicament contre la douleur) pourra être prescrit pour diminuer cette douleur. De plus, le cathéter peut causer la sensation d'un corps étranger dans la trachée.
- La présence de sang au site d'insertion du cathéter ou d'expectorations sanguines peut se produire. Il faut en surveiller la progression.

Effets secondaires habituels :

- Inconfort au pourtour de la stomie.
- Toux pendant et après l'installation.
- Accumulation de mucus à l'extrémité du cathéter pendant quelques semaines pouvant provoquer de la toux.

Rendez-vous à l'urgence de votre région si vous présentez :

1. Toux sévère non contrôlée par une médication appropriée.
2. Oedème (enflure) autour du cou ou sensation de bulles sous la peau.
3. Respiration courte ou sifflement plus important que d'habitude.
4. Nervosité extrême.
5. Saignement important au site d'insertion du cathéter ou dans les expectorations (crachats, sécrétions).
6. Fièvre (plus de 24 hres), rougeur importante, douleur sévère au site d'installation du cathéter.

Entretien

Un entretien régulier de votre cathéter Scoop 1 vous assure un bon fonctionnement. Nettoyez-le 2 fois par jour. Cependant, votre médecin peut vous dire de le faire plus souvent. Mettez votre lunette nasale pendant le nettoyage du cathéter.

Vous avez des questions :

Vous pouvez communiquer avec l'infirmière en téléphonant au numéro **656-4570** aux heures de clinique entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi.

Vous pouvez contacter les soins respiratoires à domicile de la région de Québec au 656-4875.

Si un problème important survient, rendez-vous à l'urgence de votre région.

Par Rachel Lavallée, infirmière

Révisé Juin 2000 par groupe de travail



Endoscopie respiratoire

Oxygénation transtrachéale Cathéter Scoop



1^{er} Étage
Porte 1584
656-4570

Rendez-vous : _____

Jour : _____

Heure : _____

OXYGÉNATION TRANSTRACHÉALE CATHÉTER SCOOP

Définition

L'oxygénation transtrachéale est une méthode qui consiste à donner de l'oxygène au moyen d'un cathéter (tube) souple installé dans la partie basse du cou à travers la trachée.

Avantages :

1. L'utilisation du cathéter transtrachéal Scoop, apporte l'oxygène là où il est nécessaire. Il peut réduire le débit d'oxygène.
2. Le débit faible favorise une autonomie prolongée des systèmes d'oxygène portables.
3. Les inconvénients reliés au port de la lunette nasale et du masque sont éliminés.
4. Le visage est libéré de la lunette nasale. Le cathéter peut être caché sous un foulard ou un col de chemise.
5. Si cette technique ne répond plus à vos besoins, vous pouvez revenir à la lunette nasale. Il vous suffit de voir le pneumologue avant de retirer votre cathéter de façon permanente.

Scoop



Description

Ce cathéter est visible sur une radiographie. La chaîne est fournie lors de l'installation. Le cathéter est installé à la base du cou, habituellement entre le 2^e et 3^e anneau de la trachée.

L'installation est faite sous anesthésie locale (c'est-à-dire que vous n'êtes pas endormi mais la région du cou est « gelée »). Vous êtes assis sur une civière et on vous demande de porter la jaquette d'hôpital. Le pneumologue installe le cathéter avec l'aide de l'infirmière.

Avant l'installation :

- Aviser l'infirmière si vous prenez des anticoagulants (Coumadin ou autres).
- Éviter de prendre de l'aspirine ou produits qui en contiennent (Entrophen, Anacin) 2 semaines avant l'installation.
- Aviser l'infirmière si vous êtes allergique au latex, à l'iode, aux produits anesthésiques (Xylocaïne), à des antibiotiques ou des narcotiques (Démérol, codéine...).

Le jour de l'installation :

- Apporter votre carte de l'Hôpital Laval ainsi que votre carte d'assurance-maladie.
- N'apporter pas d'argent, de bijoux ou objets de valeur.
- Noter que le téléphone cellulaire est interdit dans l'Hôpital Laval.
- Être accompagné d'un proche pour le retour à la maison. Prévoir un séjour d'environ 3 heures.
- Prendre un léger déjeuner avant 6 h le matin. Après 6 h, seulement de l'eau, du jus ou du café sont permis. Attendre 2 h après l'installation du cathéter pour manger à cause de l'anesthésie locale reçue.

Apporter les médicaments que vous devez prendre au cours de la journée ainsi que vos médicaments par inhalation (Ventolin, Pulmicort,...)