

Pendant l'examen

L'infirmière, à la demande du médecin, retirera progressivement le cathéter de votre nez.

- À certains moments, on vous demandera d'avaler de l'eau par petite gorgée.
- De ne pas bouger ni parler ni rire.
- L'examen dure environ 30 minutes.

Après l'examen

Le cathéter est complètement retiré de votre nez. Le dispositif intraveineux est enlevé.

Vous devez attendre une heure avant de boire, manger et fumer afin que l'anesthésie de la gorge soit disparue complètement.

Risques

Il n'y a pas de risque comme tel. Vous pouvez cependant ressentir des malaises tels que: irritation de la gorge et/ou du nez, nausées et vomissements causés par l'intolérance du cathéter. Il est très rare qu'une personne ne puisse tolérer le cathéter.

Retour à la maison

Si vous ressentez un mal de gorge une fois le cathéter enlevé, un gargarisme ou des croquettes de glace devrait suffire à vous soulager. En cas de besoin urgent :

Communiquer avec l'infirmière
du lundi au vendredi,
de 8 à 16 heures
au (418) 656-4815

ou


en dehors des heures de clinique,
vous pouvez communiquer avec l'Urgence
au (418) 656-4550

Annulation

Si vous ne pouvez vous présenter à votre examen, S.V.P. aviser le service d'Endoscopie digestive au:

(418) 656-8711, poste 5000

Manométrie



Manométrie

Endoscopie digestive

Rez-de-chaussée (étage 0)

Tél.: (418) 656-8711, poste 5000

Centrale de rendez-vous

Tél.: (418) 656-4827

Jour: _____


Heure: _____

Médecin: _____

Description

La manométrie permet d'étudier le fonctionnement de l'œsophage et les organes qui lui sont associés comme le sphincter supérieur de l'œsophage (SOS) et le sphincter inférieur de l'œsophage (SOI).

Les données sont recueillies au niveau de l'œsophage, du SOS et du SOI à l'aide d'un cathéter et d'un appareil d'enregistrement pour être ensuite analysées. Les résultats permettent de diagnostiquer les troubles de la motricité (ondes de mouvement) œsophagienne.



Préparation

Pour faciliter l'installation de l'appareil, votre estomac doit être vide.

Si examen entre 8 h et 12 h

- Demeurez à jeun à partir de minuit.
- Ne prenez aucun médicament ni ceux pour le diabète incluant l'Insuline. Les examens en pompe sont permis.
- Apportez tous vos médicaments.

Si examen entre 12 h et 16 h

- Prenez avant 8 heures, un déjeuner normal et vos médicaments comme à l'habitude.
- Ne prenez aucun médicament pour le diabète incluant l'Insuline. Consultez votre médecin pour ajuster les doses.

Le jour de l'examen

- Apportez vos cartes d'assurance maladie et de l'Hôpital Laval.
- **Si vous avez votre carte de l'Hôpital Laval**, dirigez-vous directement aux Consultations externes (service d'accueil) au rez-de-chaussée (étage 0) pour faire votre inscription.
- **Si vous n'avez pas la carte de l'Hôpital Laval**, vous devez arriver 20 minutes avant l'heure de votre rendez-vous. Vous rendre à l'admission au rez-de-chaussée (étage 0) pour vous procurer votre carte de l'hôpital. Vous serez ensuite dirigé aux Consultations Externes (service d'accueil) également au rez-de-chaussée pour faire votre inscription.

Avant l'examen

Important : vous devez aviser le médecin ou l'infirmière si :

- vous avez déjà présenté des allergies ou des réactions à des médicaments;
- vous êtes diabétique;
- vous prenez un anticoagulant (ASA, Coumadin, Entrophen, Plavix, Sintrom)

Procédure

Le médecin ou l'infirmière vous explique l'examen. **Poser des questions si les explications ne sont pas claires.**

- Vous devez mettre une jaquette d'hôpital.
- Vous devez enlever vos prothèses dentaires et vos lunettes.
- Vous serez allongé pour l'examen avec la tête du lit élevée à 45°.

Un anesthésique local (Zylocaïne) est utilisé pour engourdir la muqueuse à l'intérieur du nez. L'infirmière procède ensuite à l'installation du cathéter en passant par votre narine. Le tube est temporairement fixé à votre joue avec un diachylon.

Nous vous installons un cathéter intraveineux afin de vous injecter, si l'indication de l'examen le nécessite, un médicament qui permettra d'établir plus clairement le diagnostic relié à vos symptômes.