

Stabilité et compatibilité :

Les compatibilités présentées sont une interprétation des données publiées en fonction des concentrations des médicaments étudiés et peuvent ne pas correspondre aux concentrations utilisées dans un établissement. Vérifier avec le pharmacien au besoin. La liste n'est pas exhaustive.

Pour la préparation générique du pantoprazole IV sans EDTA.

- Les fioles de pantoprazole doivent être conservées à l'abri de la lumière à la température pièce.
- Une fois préparée, la solution reconstituée de 4 mg/mL en fiole doit être administrée dans les 24 heures suivantes.
- La solution reconstituée (4 mg/mL) est stable pendant 28 jours au réfrigérateur, protégée de la lumière, lorsque mise dans des seringues en polypropylène.
- La solution est stable pendant 3 jours à la température pièce (luminosité normale) et 28 jours au réfrigérateur (à l'abri de la lumière) lorsque diluée dans du NaCl 0,9% à une concentration de 0,8 mg/mL dans des sacs en PVC.
- Dilution possible pour la perfusion IV dans le NaCl 0,9%, le D5% et le Lactate Ringer.
- Compatible en dérivation avec : aminophylline, amoxicilline-clavulanate, amphotéricine B liposomale, ampicilline, anidulafongine, argatroban, azithromycine, ceftolozane-tazobactam, ceftriaxone, ertapénem, ganciclovir, granisétron, imipenem-cilastatine, pénicilline G (sodium), phentolamine, phényléphrine, potassium chlorure, procainamide, succinylcholine, sufentanil, ticarcilline-clavulanate, tigécycline, vasopressine et zolédronique acide.
- Incompatible avec : atropine, calcium (chlorure), céfépime, céfotaxime, ciprofloxacine, cisatracurium, dantrolène, daptomycine, dexaméthasone, dexmédétomidine, diazépam, diltiazem, diphenhydramine, dobutamine, éphédrine, esmolol, famotidine, fentanyl, fluconazole, glycopyrrolate, halopéridol, hydralazine, hydroxyzine, kétorolac, labétalol, lévofloxacine, lidocaïne, linézolide, lorazépam, mépéridine, méropénem, méthylprednisolone, métoprolol, métronidazole, milrinone, moxifloxacine, multivitamines intraveineuses, mycophénolate mofétil, naloxone, ondansétron, pentamidine, phénytoïne, phosphate (potassium et sodium), propranolol, ranitidine, rémifentanil, rocuronium, vérapamil et voriconazole.

Précautions :

- **Effets indésirables** : diarrhée, douleur abdominale, céphalée, réaction au site d'injection.