



Règle d'utilisation des médicaments

Sugammadex (Bridion ^{md})	N° :	RU-054
	Page :	1 de 2
	Émise le :	2017-03-28
	Révisée le :	2022-02-15
	Prochaine révision :	2025

Personnes habilitées
Médecins

Clientèle visée
Usager adulte admis ou inscrit

Indications
L'utilisation à l'Institut est acceptée pour renverser la curarisation après l'administration de rocuronium pour les situations suivantes :
<ul style="list-style-type: none"> - en situation d'urgence pour les usagers devant subir une décurarisation immédiate, lorsque cette curarisation contribue au compromis de la ventilation pulmonaire en raison d'une incapacité de ventiler ou d'intuber l'usager; - chirurgie annulée ou écourtée; - chirurgie de courte durée qui nécessite une curarisation profonde; - suspicion de curarisation résiduelle post néostigmine; - chirurgie à risque de complication respiratoire post-opératoire, comme l'oesophagectomie.

Précautions
Le sugammadex n'est pas recommandé en insuffisance rénale sévère DFGe inférieur à 30 mL/min/1,73m ² .

Contre-indications
Hypersensibilité

Directives
Doses
<ul style="list-style-type: none"> - pour décurarisation immédiate en situation d'urgence : une dose unique de 16 mg/kg - pour les autres indications : une dose unique de 2 mg/kg ou 4 mg/kg
Administration : par voie intraveineuse en bolus unique, injection rapide en 10 secondes.
Chaque fiole contient 100 mg/mL de sugammadex. Fioles 2 et 5 mL. Conserver les fioles à une température de 15 à 30 °C. Protéger de la lumière. Les fioles qui ne sont pas protégées de la lumière doivent être utilisées dans les 5 jours.

Règle d'utilisation des médicaments

Sugammadex (Bridion^{md})	N° :	RU-054
	Page :	2 de 2
	Émise le :	2017-03-28
	Révisée le :	2022-02-15
	Prochaine révision :	2025

Limites
aucune

Surveillance
<ul style="list-style-type: none">• Toux• Anaphylaxie

Élaborée par :

M^{me} Isabelle Cloutier, pharmacienne
M. Alain Dumas, pharmacien

Révisée par (lors de la mise à jour) :

D^{re} Lorrie Trembaly, anesthésiologiste
M^{me} Julie Racicot, pharmacienne chef

Personnes consultées :

D^{re} Stéphan Langevin, chef du Département d'anesthésiologie

Validée par :

M^{me} Julie Racicot

Chef du Département de pharmacie

2022-02-16

Date

D^r Daniel Lefrançois

Directeur des services professionnels

2022-02-16

Date

Approuvée par :

M. Denis Bouchard

Secrétaire du conseil d'administration

2022-02-16

Date

Date de diffusion : le
Révisions antérieures : 2018-05-08