



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC



POUR DIFFUSION
IMMÉDIATE

Communiqué interne

COURRIER ÉLECTRONIQUE ET INTRANET

DESTINATAIRES : Membres du CMDP
Résidents en médecine et infirmières praticiennes spécialisées
Direction des soins infirmiers
Direction des services professionnels

EXPÉDITEUR : Julie Racicot, chef du département de pharmacie

DATE : 22 mars 2017

OBJET : **Ajout du sugammadex (Bridion^{md}) au formulaire de l'IUCPQ-UL avec restrictions**

Les membres du comité de pharmacologie ont entériné l'ajout du sugammadex (Bridion^{md}) au formulaire de l'IUCPQ-UL avec restrictions. Le sugammadex n'est pas encore sur la liste provinciale des établissements. Toutefois, l'INESSS a procédé à l'évaluation du médicament et a émis un avis favorable au Ministre pour des circonstances précises. En ce sens, le sugammadex est autorisé pour utilisation à l'IUCPQ-UL en situation d'urgence pour l'utilisateur devant subir une décurarisation immédiate après l'administration de rocuronium, lorsque cette curarisation contribue au compromis de la ventilation pulmonaire en raison d'une incapacité de ventiler ou d'intuber l'utilisateur. Le sugammadex n'est pas autorisé à l'IUCPQ-UL pour la décurarisation d'un bloc neuromusculaire modéré ou profond lorsque la ventilation pulmonaire n'est pas compromise. Une règle d'utilisation du sugammadex a été élaborée et sera disponible sur l'Intranet suite à son adoption par le conseil d'administration. L'utilisation de cet antidote fera l'objet d'une revue d'utilisation annuellement.

Le sugammadex est disponible au bloc opératoire, au cabinet de l'urgence en salle de réanimation, au cabinet de nuit au 5^e PC et à la pharmacie. À chacun de ces endroits, 10 fioles sont disponibles (100 mg/mL format 2 mL), ce qui permet l'administration de la dose recommandée de 16 mg/kg pour un usager ad 125 kg.