



INFO-MÉDICAMENT

*Document préparé par le département de
pharmacie à l'intention des usagers*

Les inhibiteurs du SGLT2

- canagliflozine (Invokana^{md})
- dapagliflozine (Forxiga^{md})
- empagliflozine (Jardiance^{md})
- une combinaison d'un inhibiteur du SGLT2 avec un
autre antidiabétique oral : _____

HORAIRE _____

1. ACTION DU MÉDICAMENT

- Cette classe de médicaments est utilisée dans le traitement du diabète de type 2, en permettant un meilleur contrôle du taux de sucre dans le sang. Elle augmente l'élimination du glucose dans les urines en empêchant sa réabsorption dans la circulation sanguine au niveau des reins.
- L'empagliflozine diminue également le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral chez les personnes déjà atteintes d'une maladie cardiovasculaire. Il retarde aussi la progression de la maladie rénale.

2. CONSEILS

- Ce médicament est habituellement pris 1 fois par jour, avec ou sans nourriture, préférablement avant le premier repas de la journée.
- Vous devez le prendre de façon régulière et continue afin d'obtenir les effets escomptés sur le contrôle de votre glycémie, et ce, même si vous vous sentez bien.
- Assurez-vous de garder une bonne hydratation (tout en respectant votre restriction hydrique, le cas échéant).
- **Si vous présentez des vomissements, de la diarrhée, ou que vous êtes déshydraté, cessez temporairement votre médicament et consultez votre pharmacien(ne) ou votre médecin.**
- Si vous oubliez de prendre une dose du médicament, prenez-la dès que vous vous en rendez compte, puis prenez la dose suivante au moment habituel. Ne doublez jamais une dose pour compenser celle que vous avez oubliée.

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- La canaglifozine et la dapagliflozine ne doivent pas être coupés, croqués ou écrasés. Avalez-les en entier.
- Demandez toujours à votre pharmacien(ne) ou à votre médecin avant d'acheter un médicament en vente libre ou un produit de santé naturel. Ces produits pourraient ne pas vous convenir.
- À moins d'indication contraire de votre médecin, ne prenez pas de suppléments de potassium.
- Lorsque vous débuterez ce médicament, si vous prenez encore de l'insuline ou un médicament appartenant à la classe des sulfonyles comme le Diamicon^{md} (gliclazide) ou le Diabeta^{md} (glyburide), il se peut que les posologies de ces médicaments nécessitent un ajustement à la baisse. Il faudra prendre vos glycémies régulièrement les premières semaines.
- Ce médicament doit généralement être cessé 3 jours avant une chirurgie majeure et être repris après l'opération uniquement lorsque l'alimentation est redevenue normale. Parlez-en à votre médecin si vous devez subir une chirurgie.

4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER

- Baisse de pression et étourdissements, surtout si vous vous levez trop rapidement
- Augmentation du volume des urines
- Symptômes d'hypoglycémie si le médicament est utilisé avec de l'insuline ou un médicament appartenant à la classe des sulfonyles comme le Diamicon^{md} (gliclazide) ou le Diabeta^{md} (glyburide) :
 - o faiblesse, étourdissements, tremblements
 - o Assurez-vous de garder des comprimés de glucose (ex : Dex4) à portée de main si jamais vous veniez à présenter de tels symptômes.

5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ

- De la douleur/sensibilité, une plaie ou une infection au niveau des jambes ou des pieds
- **Des symptômes d'infection urinaire ou d'infection des organes génitaux (ex : douleur ou brûlement à la miction, démangeaisons, etc.)**
- Des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, de la diarrhée, de la fatigue inhabituelle, de la confusion ou une soif excessive.