

Ajustement des suppléments de vitamine D per os post-gastrectomie pariétale seule	N°:	PRO-172
	Page :	1 de 3
	Émis le:	2018-03-12
	Révisé le :	à venir
	Prochaine révision :	2021

Professionnels habilités
Infirmières et infirmiers cliniciens

Secteur d'activité visé
Clinique externe de chirurgie bariatrique

Clientèle visée
Usager inscrit ou admis de 16 ans et plus ayant subi une gastrectomie pariétale seule depuis plus de 4 semaines et dont le résultat de vitamine D25 (OH) est inférieur ou égal à 75 nmol/L


Description du protocole			
Contre-indications :			
<ul style="list-style-type: none"> Allergie connue à la vitamine D₃ (D-Tabs^{md}); Calcémie corrigée supérieure ou égale à 2,45 mmol/L; Insuffisance rénale (DFGe inférieure à 45 mL/min/1,73 m²); Aucun autre supplément de vitamine D (vente libre ou prescrit) pris par l'usager autre que la multivitamine (Centrum^{MD}). 			
Avant de faire les ajustements vitamine D :			
<ul style="list-style-type: none"> Vérifier l'horaire et la constance de la prise des suppléments. 			
AJUSTEMENT DES SUPPLÉMENTS DE VITAMINE D :			
Objectif visé :	Vitamine D25 (OH) 75-200 nmol/L.		
Dose standard et maximale:	Vitamine D ₃ 1000 unités 1 co p.o. id <u>OU</u> DTabs ^{md} 10 000 unités 1 co p.o. 1 fois par semaine.		
Suivi du bilan sanguin : 4 mois après un ajustement et puis, selon le tableau suivant :			
	1 ^e année post-gastrectomie	2 ^e année post-gastrectomie	Années subséquentes post-gastrectomie
	• q 4 mois	• q 6 mois	• 1 fois par année
Bilan sanguin : Sodium, potassium, chlore, créatinine, vitamine D25 (OH), phosphatase alcaline, calcium, magnésium, phosphore, albumine, PTH.			

Ajustement des suppléments de vitamine D per os post-gastrectomie pariétale seule

N°: PRO-172
 Page: 2 de 3
 Émis le: 2018-03-12
 Révisé le: à venir
 Prochaine révision: 2021

Description du protocole (suite)

Ajustement : Algorithme d'ajustement



Surveillance :

Aviser l'usager de contacter l'infirmière de chirurgie bariatrique du secteur ambulatoire en présence de signes d'allergie ou d'intolérance lors de l'introduction initiale de la vitamine D. Aviser le chirurgien en tel cas.

Ajustement des suppléments de vitamine D per os post-gastrectomie pariétale seule	N° :	PRO-172
	Page :	3 de 3
	Émis le :	2018-03-12
	Révisé le :	à venir
	Prochaine révision :	2021

Références
Outils cliniques : aucun Bibliographie : aucun

Élaboré par :

M^{me} Isabelle Giroux, pharmacienne
M^{me} Anne-Marie Goulet, conseillère cadre aux activités cliniques
D^r Simon Marceau, chef du Département de chirurgie générale et bariatrique
M^{me} Nathalie Vadeboncoeur, conseillère cadre aux activités cliniques

Personnes consultées (dernière version)

Équipe des chirurgiens généraux
M^{me} Julie Deschamps, infirmière clinicienne
M^{me} Marie-Claude St-Pierre, chef d'unité de soins intérimaire

Validé par (dernière version) :

D^r Simon Marceau
Chef du Département de chirurgie générale et bariatrique

2018-03-12
Date

M^{me} Julie Racicot
Chef du Département de pharmacie

2018-03-12
Date

M^{me} Nathalie Thibault
Directrice des soins infirmiers

2018-03-12
Date

Approuvé par :

D^r Bruno Raby
Président du CMDP

2018-03-12
Date

Date d'entrée en vigueur : le 14 mars 2018
Révisions antérieures : aucune