

## INFO-MÉDICAMENT

*Document préparé par le département de  
pharmacie à l'intention des usagers*

### RIOCIGUAT (Adempas<sup>md</sup>)

**HORAIRE :** \_\_\_\_\_

#### 1. ACTION DU MÉDICAMENT :

Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire une pression élevée dans les vaisseaux sanguins entre le cœur et les poumons. Il permet une réduction de la pression en dilatant les artères pulmonaire et contribue à améliorer la capacité à l'effort et à réduire les symptômes d'hypertension pulmonaire.

#### 2. CONSEILS :

- Ce médicament se prend trois fois par jour aux 6 à 8 heures, avec ou sans nourriture.
- Vous devez le prendre régulièrement et de façon continue pour maintenir ses effets bénéfiques. N'arrêtez jamais de prendre Adempas<sup>md</sup> sans l'accord de votre médecin. L'interruption soudaine de la prise du médicament pourrait aggraver vos symptômes reliés à l'hypertension pulmonaire.
- L'objectif est de trouver la dose adéquate pour chacun des patients; vous débuterez donc à la dose de départ recommandée qui sera ensuite augmentée toutes les deux semaines selon votre tolérance.
- Si vous avez oublié de prendre un comprimé, ne compensez pas en prenant deux comprimés. Prenez plutôt la dose suivante comme prévu.
- Si un arrêt de trois jours ou plus a été fait, contactez votre médecin avant de le redébuter.
- Ne prenez jamais de médicaments achetés sans prescription ou des produits naturels sans d'abord consulter votre pharmacien ou votre médecin.

### **3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :**

- Éviter ce médicament si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au riociguat ou à un de ses composants.
- Éviter ce médicament si vous êtes enceinte, prévoyez le devenir ou allaitez.
- Éviter l'usage concomitant de sildenafil (Viagra<sup>md</sup>, Revatio<sup>md</sup>), tadalafil (Cialis<sup>md</sup>, Adcirca<sup>md</sup>), vardenafil (Levitra<sup>md</sup>, Staxyn<sup>md</sup>) ou nitroglycérine.
- Surveiller votre tension artérielle selon les recommandations de votre infirmière.
- Conserver le médicament entre 15 et 30°C et hors de la portée des enfants.
- Ce médicament doit être pris au moins 1 heure avant la prise de médicaments comme Maalox<sup>md</sup> ou Gaviscon<sup>md</sup>.

### **4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :**

Généralement de faible intensité, les effets indésirables possibles incluent :

- Maux de tête (l'acétaminophène/Tylenol<sup>md</sup> peut vous soulager)
- Étourdissements, baisse de la tension artérielle
- Œdème des membres
- Brûlements d'estomac
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhées

### **5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :**

- Que l'intensité des effets indésirables mentionnés ci-dessus est trop sévère et nuit à vos activités quotidiennes.
- Des signes de réaction allergique au produit (enflure au visage ou à la gorge, douleurs ou serrement thoracique).
- Des difficultés respiratoires qui augmentent pendant le traitement avec Adempas<sup>md</sup>.
- Des signes ou symptômes d'une éventuelle grossesse.
- De la toux avec des crachats de sang.