

INFO-MÉDICAMENT

*Document préparé par le département de
pharmacie à l'intention des usagers*

SELEXIPAG (Uptravi^{md})

HORAIRE : _____

1. ACTION DU MÉDICAMENT :

Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire une pression élevée dans les vaisseaux sanguins entre le cœur et les poumons. Il permet une réduction de la pression en dilatant les artères pulmonaire et en contribuant à diminuer leur durcissement.

Il peut être utilisé seul, en combinaison avec les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 (sildenafil/Revatio^{md}, tadalafil/Adcirca^{md}) ou les antagonistes des récepteurs de l'endothéline (macitentan/Opsumit^{md}, bosentan/Tracleer^{md}) ou en triple thérapie.

2. CONSEILS :

- Ce médicament se prend deux fois par jour le matin et le soir, avec ou sans nourriture. La tolérance est toutefois améliorée avec un repas,
- Vous devez le prendre régulièrement et de façon continue pour maintenir ses effets bénéfiques. N'arrêtez jamais de prendre Uptravi^{md} sans l'accord de votre médecin. L'interruption soudaine de la prise du médicament pourrait aggraver vos symptômes reliés à l'hypertension pulmonaire.
- L'objectif est de trouver la dose adéquate pour chacun des patients; vous débuterez donc à la dose de départ recommandée qui sera ensuite augmentée selon la réponse de votre corps.
- Si vous oubliez une dose, prenez là dès que possible sauf si un délai de moins de 6 heures est prévu avant la dose suivante. Ne doublez pas la dose suivante.
- Si un arrêt de trois jours ou plus a été fait, contactez votre médecin avant de le redébuter.
- Ne prenez jamais de médicaments achetés sans prescription ou des produits naturels sans d'abord consulter votre pharmacien ou votre médecin.

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Éviter ce médicament si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au selexipag ou à un de ses composants.
- Ne pas écraser ou couper les comprimés.
- Conserver le médicament entre 15 et 30°C et hors de la portée des enfants.

4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :

Généralement de faible intensité et temporaires, les effets indésirables possibles incluent :

- Maux de tête (l'acétaminophène/Tylenol^{md} peut vous soulager)
- Nausées (le dimenhydrinate/Gravol^{md} peut vous aider)
- Douleurs à la mâchoire, aux articulations ou aux muscles (l'acétaminophène/Tylenol^{md} peut vous soulager)
- Douleurs abdominales
- Diarrhées (le loperamide/Imodium^{md} peut vous aider)
- Rougeurs au visage
- Hypotension (chute de pression)

5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Que l'intensité des effets indésirables mentionnés ci-dessus est trop sévère et nuit à vos activités quotidiennes.
- La diarrhée n'est pas résolue avec la prise de loperamide (Imodium^{md}).
- Des signes de réaction allergique au selexipag (enflure au visage ou à la gorge, douleurs ou serrement thoracique).