

# INFO-MÉDICAMENT

*Document préparé par le département  
de pharmacie à l'intention des usagers*

TADALAFIL (Adcira<sup>md</sup>)       SILDENAFIL (Revatio<sup>md</sup>)

**POSOLOGIE :** \_\_\_\_\_

## 1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est utilisé dans le traitement de l'hypertension pulmonaire (pression élevée dans les vaisseaux sanguins situés entre le cœur et les poumons). Il diminue la pression pulmonaire anormalement élevée en permettant une relaxation de ces vaisseaux.

## 2. CONSEILS :

- Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans nourriture.
- Vous devez le prendre régulièrement et de façon continue pour maintenir ses effets bénéfiques. Même si vous vous sentez bien, ne diminuez pas et n'arrêtez jamais votre médication sans l'accord de votre médecin. L'interruption soudaine de la prise du médicament pourrait aggraver vos symptômes.
- Si vous oubliez de prendre une dose du médicament, prenez-la dès que vous vous en rendez compte, puis prenez la dose suivante au moment habituel. Ne doublez jamais une dose pour compenser celle que vous avez oubliée.

## 3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Vous devez éviter de manger du pamplemousse ou de boire son jus, évitez les oranges de Séville, les limettes et les pomélos en tout temps et ce, pendant toute la durée de votre traitement. Ces fruits peuvent modifier l'effet de votre médicament.
- Vous devez éviter la prise de nitroglycérine sous toutes ses formes (comprimé, timbre ou pompe). Dans le doute, informez-vous auprès de votre pharmacien(ne).
- Demandez toujours à votre pharmacien(ne) ou à votre médecin avant de débiter des médicaments en vente libre ou des produits de santé naturels. Ces produits pourraient interagir avec votre médicament ou pourraient ne pas vous convenir.
- Évitez la consommation excessive d'alcool. Limitez-vous à une ou deux consommations occasionnellement.

## 4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :

- Maux de tête, insomnie
- Étourdissements et vertiges : prévenez cet effet en vous levant lentement de votre lit ou de votre fauteuil. Ces effets disparaissent après les premiers jours de traitement.
- Bouffées de chaleur, rougeur au visage
- Érythème cutané
- Troubles digestifs (indigestion, brûlure d'estomac)
- Congestion nasale ou écoulement nasal, toux
- Sildenafil : modification temporaire de la perception des couleurs (bleu/vert)

## 5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une fatigue inhabituelle
- Une perte de vision ou d'audition soudaine
- Une érection pénienne indépendante de la libido, douloureuse, qui persiste au moins 2 heures nécessite une consultation immédiate à l'urgence
- Des douleurs thoraciques et/ou des palpitations cardiaques.